

Gynekologinen laserhoito

Laserhoidossa poistetaan emättimen esiastemuutos.

Hoitoa kuukautisten aikana pyritään välttämään. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on runsasta veristä vuotoa hoidon ajankohtana. Jos käytät ehkäisypillereitä, voit kysyä neuvoa kuukautisten siirtämisestä sinua hoitavasta yksiköstä.

Valmistautuminen ja laserhoito

Voit ottaa tunti ennen toimenpiteeseen tuloa kipulääkkeen.

Laserhoidossa lasersäde haihduttaa muutosalueen emättimestä. Hoito tehdään poliklinikkakäynnillä [Kolposkopiatutkimuksen](#) yhteydessä, eikä sen jälkeen tarvita sairauslomaa. Aikaa käynnille on varattu noin 45–60 minuuttia.

Hoidon jälkeen kotona

Hoidon jälkeen voit tarvittaessa ottaa kipuun apteekista ilman reseptiä saatavaa kipulääkettä.

Tulehdus- ja vuotoriskin vuoksi uimista, kylpyjä, yhdyntöjä sekä tamponien tai kuukuppien käyttöä tulee välttää, kunnes mahdollinen jälkivuoto on loppunut.

Näytevastauksien kuulemisesta ja jatkoseurannasta sovitaan yksilöllisesti.

Mahdolliset ongelmat ja yhteystiedot

Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön, jos sinulle tulee hoidon jälkeen alavatsakipua, kuumetta tai runsasta, pahanhajuista jälkivuotoa. Oireet voivat olla merkki tulehduksesta.