

Operation vid bröstcancer, borttagning av en del av bröstet

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Ingrepp

Operationen görs vanligen under sövning. Om cancerförändringen är liten och man inte kan känna den med fingrarna, gör man på operationsmorgonen först en så kallad trådmärkning. Med hjälp av märkningstråden tas cancerförändringen bort från bröstet. För att hitta portvaktslymfkörtlarna sprutar man även in ett radioaktivt spårämne i bröstet på operationsmorgonen. Dessutom kan man lokalisera portvaktslymfkörtlarna med hjälp av ett blått färgämne, vilket har som bieffekt att urinen färgas blågrön.

Laddade lymfkörtlar skickas under operationen till patologen för undersökning. Om man hittar cancermetastaser i lymfkörtlarna, avlägsnar man ytterligare lymfkörtlar från armhålan under samma operation och en drän sätts till armhålan.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Under sjukledigheten bör man undvika tyngre fysisk ansträngning. För att bevara rörelseomfånget i axeln och minska svullnad bör man använda en stödjande BH och utföra de rörelseserier som fysioterapeuten gett föreskrifter om. Fysioterapeuten får du träffa efter operationen.

Sårvård

De tjockare sårförbanden får tas bort dagen efter operationen och såren får duschas efter det. Såret har självabsorberande stygn. Såretejpen kan tas bort efter en vecka. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen. Om man har satt en drän, kan den tas bort vid hälsovårdscentralen enligt kirurgens föreskrifter, senast 7 dagar efter operationen.

Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet i 1–4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Paracetamol

Anti-inflammatoriskvärkmedicin

Andra mediciner

Efterkontroll sker vanligen efter 3–4 veckor vid kirurgiska polikliniken. De slutgiltiga provsvaren fås i samband med kontrollen.

Sjukledighet är i allmänhet 2–3 veckor beroende på ingreppet och hur tungt arbete man har.

Kontaktuppgifter

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör i första hand kontakta den vårdande enheten:

Dagkirurgiska avdelningen, vardagar klockan 07.00–15.00, telefon 06 213 1552

Den egna hälsovårdscentralen eller arbetshälsovården

Telefonrådgivning måndagar till torsdagar klockan 15.00–08.00 och fredagar klockan 14.00–08.00 samt dygnet runt under helger och veckoslut, telefon 116 117