

Endoskopi av magsäcken alltså gastroskopi

Endoskopi av magsäcken, alltså gastroskopi, görs för att konstatera sjukdomar eller funktionella störningar i magsäcken eller tolvfingertarmen. I samband med endoskopin kan det göras små åtgärder.

Förberedelser hemma före endoskopin

- Du får inte äta, dricka eller röka 6 timmar före endoskopin.
- Kontakta den vårdande enheten i förväg ifall du använder mediciner som påverkar blodets koagulering (bl.a. Primaspan®, Marevan®, Xarelto®, Eliquis®, Omega-3®)
- Ifall du använder mediciner som påverkar blodets koagulering (t.ex. Marevan) eller anti-inflammatoriska värkmediciner skall du nämna det före endoskopin åt läkaren.
- Morgonmedicinen får du ta efter undersökningen, undantag kan diskuteras med läkaren.

Så här går undersökningen till

Endoskopet förs via munnen till magsäcken. Om du har problem att svälja endoskopet kan svalget vid behov bedövas med spray. Du kan andas själv under hela undersökningen. Endoskopin kan orsaka fyllnadskänsla men inte egentligen smärta. Du ligger på vänstra sidan på undersökningsbordet. Endoskopin räcker ca 20 minuter.

Efter endoskopin

- Du får äta och dricka normalt, men undvik het och grov mat sex timmar efteråt. Om svalget har bedövats skall du vänta med ätande tills bedövningen släppt. Bedövningens effekt varar ungefär en timme.
- Du får ta dina mediciner som normalt. Ifall det har gjorts någon åtgärd i samband med endoskopin skall du undvika att använda värkmedicin som irriterar magen på undersökningsdagen p.g.a. blödningsrisken.
- Vid behov får du ett intyg för vistelsen på sjukhuset.
- Endoskopi av magsäcken förutsätter vanligtvis inte sjukledigt.

Ifall det uppstår problem, kontakta den vårdande enheten eller jouren.