

COVID-19 skyddsåtgärder, misstänkt eller påvisat fall (droppskyddsåtgärder)

Obs! Vid åtgärder som ger upphov till aerosoler (slemsugning från andningsvägarna, nebulisatorbehandling, bronkoskopi, intubering, återupplivning) används dessutom andningsskydd av klassen FFP2 eller 3 och skyddsglasögon eller visir som täcker hela ansiktet, se anvisning: [COVID-19 skyddsutrustning vid åtgärder som producerar aerosoler](#) (på finska)

Besökare

Anmäl dig på avdelningen innan du går in i patientrummet. Besök hos patient hålls till ett minimum. Besökare handleds i att genomföra handhygien och i användningen av skydd.

Händerna

Alltid desinfektion med handsprit.

MUN-NÄSSKYDD

(kirurgiskt) kortvariga besök i rummet



ELLER andningsskydd av klass FFP2- eller FFP3

(besök som varar en längre tid eller åtgärd som producerar aerosoler)



SKYDDSGLASÖGON eller ansiktsvisir



I enlighet med droppskyddsåtgärderna, vid vård av patient med symptom.

Skyddsrock

Vid behov, i enlighet med normala skyddsåtgärder, om det finns en risk för sekretstänk.

Skyddshandskar

Vid behov, i enlighet med normala skyddsåtgärder, om det finns en risk för sekretstänk.

Städning / desinfektion

Klor 500 ppm / etanolbaserade produkter, produkter som innehåller perättiksyra / väteperoxid.
Engångsutrustning / rumsspecifik utrustning.

Patienttransport

Föraren använder skyddsutrustning enligt anvisningarna. Föraren desinficerar händerna före och efter transporten. **Patienten** använder ett kirurgiskt mun-nässkydd under transporten.

Efter varje vårdåtgärd tas handskarna bort i patientrummet och händerna desinficeras. Vid behov sätts rena skyddshandskar på.