

Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggen (ASD, PFO)

Det har konstaterats att du har en öppning i förmaksskiljeväggen. Denna öppning kan slutas med en stängningsanordning via venen med hjälp av ultraljud.

Före åtgärden

- Du får separata anvisningar om eventuella läkemedels uppehåll, fasta och om undersökningar som utförs före åtgärden.
- Huden i ljumskområdet bör vara i bra skick före åtgärden på grund av operationsområdets infektionsrisk.

Under åtgärden

Åtgärden utförs under anestesi i ett angiologaboratorium.

Vid transplantationen för man in stängningsanordningen via venen i ljumskan till hjärtat. Till hjälp används ultraljudsundersökning som görs via matstrupen, röntgen strålning och ibland också kontrastmedel som innehåller jod.

Åtgärden räcker cirka en timme. Allvarliga komplikationer är sällsynta.

Efter åtgärden

Efter ingreppet är du under observation och i sängvila enligt läkarens direktiv.

Efter ingreppet är det vanligt att man har halsen sjuk på grund av nersövningen och att man gjort via matstrupen ultraljud. Det kan förekomma ett blåmärke i ljumskan men inga andra känningar bör man ha.

Utskrivningen sker oftast dagen efter åtgärden. Dagen efter åtgärden görs en ultraljudsundersökning av hjärtat. Utskrivningen och eftervård sker individuellt enligt läkarens anvisningar.

Stängningsanordningen är inte ett hinder för magnetundersökning (MRI). Magnetundersökning rekommenderas ändå inte under det första halvåret efter åtgärden. Ifall du hamnar att besöka tandläkaren inom 3 månader från reparationen av förmaksskiljeväggen till exempel vid tandborttagning, bör antibiotikabehandling påbörjas.

Kontakta din vårdande enhet

- Om du har infektions symptom eller feber.

- Om du misstänker att du är gravid, under åtgärden används röntgenstrålning.

[Sydänsairaudet.fi](https://sydänsairaudet.fi) bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.